Baggrund

Ved håndtering af CVK er der øget risiko for at tilføre borgeren infektioner direkte til blodbanen, hvilket kræver særlig fokus på hygiejne under håndteringen af det.

Hæmatologisk afdeling på Odense Sygehus, har valgt at benytte Citraflow til at gennemskylle CVK, hvor denne procesure skal benyttes. Har den ordinerende afdeling ordineret Heparin til gennemskylning, skal denne procedure ikke benyttes.

Formål

At sikre en korrekt håndtering af CVK, så man hindre tilstopning af slangen med forøget risiko for vækst af mikroorganismer.

Ved gennemskylning af CVK, skylles først med 10ml steril saltvand (NaCl) og efterfølgende sprøjtes Citraflow 4% ind, som leveres i optrukne sprøjter. Proceduren foretages x 1 ugentlig ved løb, der ikke er i anvendelse.

Klargøring af remedier

Rene handsker, alkoholswaps (kan bruges så længe den er fugtig og synlig ren under en procedure), steril prop, sprøjte med 10ml Nacl, sprøjte med Citraflow 4 % af 2,5ml, rent blåt stykke til at lægge remedierne på.

Fremgangsmåde

- Remedierne klargøres
- Borgerne informeres og lejres i rygleje
- Hænderne desinficeres
- Sikre sig at ”åbne – lukke” mekanismen er lukket til borgeren
- Proppen aftages, og CVK holdes fortsat uden at røre ved noget
- Studsen på CVK afsprittes
- Sprøjten med NaCl skrues på CVK og ”åbne – lukke” mekanismen åbnes hvorefter NaCl sprøjtes ind
- ”åbne – lukke” mekanismen lukkes, den tomme NaCl sprøjte aftages, hvorefter CVK studsen afsprites
- Man sikrer sig at der ikke er luft i sprøjten med Citraflow 4 %, og påsætter den CVK studsen
- ”åbne – lukke” mekanismen åbnes og de 2,5ml Citraflow 4 % sprøjtes ind

- ”åbne – lukke” mekanismen lukkes og sprøjten aftages
- CVK studsen afsprittes og der påsættes en ny steril prop

Litteraturhenvisning

Hæmatologisk afdeling Odense Sygehus, hygiejneansvarlig sygeplejerske Anne Lykkegård Hansen

www.citra-lock.com