

KLYSMA

Værd at vide

- Klyismaer er flydende, afmålte lægemidler beregnet til indhældning (indsprøjtning) i endetarmen. De består af éngangsbeholdere af plastik forsynet med en rektalspids, således at de kan indføres så dybt, at indholdet ikke straks løber ud igen.
- Klyismaer anvendes oftest til lokal brug, f.eks. afføringsmidlet Klyx.
- Nogle klyismaer skal helst tages ved sengetid, for at borgeren kan holde på det længst muligt.
- For afføringsmidlet Klyx indtræder virkningen efter 5 - 20 minutter.
- For Stesolid klyisma indtræder virkningen i løbet af få minutter.

Husk altid

- Læs vejledningen i pakningen. Der kan være særlige forholdsregler ved det enkelte præparat.
- Benyt handsker

Sådan gøres det

- Før du bruger Klyx kan du opvarme flasken i vandbad til kroppens temperatur.
- Ved indføring af klyisma ligger borgeren på venstre side (pga. tarmens forløb) med benene let bøjede. Inden indføringen kan man fugte rektalspidsen med vand, vaseline eller en dråbe af tubens indhold. Når spidsen er indført i hele sin længde, tømmes beholderen, og denne holdes sammenpresset, mens spidsen trækkes ud igen. Væsken tilbageholdes i endetarmen så længe som muligt.

Særlige forholdsregler:

Klinisk procedure / vejledning

Emne Klysma

Version 1.00