


INFORMATION OM MUS, ROTTER OG MÅR



ER DET EN HUSMÅR ELLER HAR DU ROTTER PÅ LOFTET?

Man ser normalt ikke meget til sine husmårer. De kommer først frem om natten for at jage og vender tilbage, før man står op. Det første, man bliver opmærksom på, vil næsten altid være larmen, når måren tumler sig på loftet. En mår gnaver imidlertid ikke i træværk og lignende, og hører man derfor gnave-lyde fra loftet, drejer det sig uden tvivl om mus eller rotter.

EKSKREMENTER

Et sikkert tegn på mårens tilstedeværelse vil være dens ekskrementer. De er normalt 8-10 cm lange og 1-2 cm tykke, og som regel er de snoede og trukket ud i en spids. Indholdet består af hår, fjer og knoglerester. Husmårens ekskrementer lugter stærkt, og den bruger ofte særlige latrinpladser, hvor der kan ligge store mængder ekskrementer.



Husmårens forfodsspor er på nogenlunde fast bund ca. 3,5 cm langt og ca. 3,2 cm bredt. Bagfodsporet er ca. 4 cm langt og 3 cm bredt. Skridtlængden er som regel forholdsvis lille. Spring er langt den mest fortrukne gangart, som mårerne benytter under de fleste forhold, om end de til tider bevæger sig i gang eller trav og her ofte sætter bagfoden i forfodssporet.



ROTTER PÅ LOFTET

Lyden fra en rotte bliver ikke så sjældent forvekslet med støjen fra en husmår. Hører man gnave-lyde, er det uden tvivl rotter, som er på spil. Kan man ikke finde ekskrementer eller andet, som afslører dyrets art, kan man eventuelt drysse mel på et område og se efter fodspor i det. Gnavspor i gule-rødder eller i en skive margarine, som lægges ud på loftet, vil også kunne vise, hvad det drejer sig om.

FODSPOR

Husmårens fodspor er aflangt. Der er som regel tydelig aftryk af klørne, og et mårspor kan altså let skelnes fra det runde spor af en tamkat.



Eksempel på udseende af ekskrement fra en husmår.

SÅDAN KAN DU SE FORSKEL PÅ MUS OG ROTTER

SKOV MUS

Kropslængde ca. 8 – 10 cm, halen ligeså lang. Vægt: 15 – 25 g. Skovmusen minder om halsbåndsmusen, men er ikke så stor, og har ikke det brune bånd på halsen.



HUSMUS

Kropslængde ca. 7 – 10 cm, halen ligeså lang. Vægt: 12 – 24 g. Husmusen er ensfarvet brun/grå, og har ikke den samme udtalte farveforskel mellem bug og rygside som skov- og halsbåndsmusen.



HALSBÅNDSMUS (SPRINGMUS)

Kropslængde ca. 9 – 13 cm, halen en lille smule længere end kroppen. Vægt: 25 – 50 g. Halsbåndsmusen har et brunt bælte eller plet på halsen. Stor farveforskel mellem ryg og bugside. En stor mus med spinkle lemmer og store øjne og ører. Halsbåndsmusen forveksles ofte med rotteunger.



MARKMUS

Kropslængde ca. 9½ – 12 cm, halelængde ca. 3 – 4½ cm. Vægt op til 45 g. De små ører og den meget korte hale er de vigtigste kendetegn hos markmusen, der kan være et alvorligt skadedyr i skov- og agerbruget.



BRUN ROTTE

Kropslængde ca. 21 – 29 cm, halelængde ca. 17 – 23 cm. Vægt: 200 – 450 g. Lille farveforskel mellem ryg og bug. To-farvet hale: (sort overside/lysere underside). Snudepartiet er mere stumpt end hos musene, der har spidse snuder. Rotteunger har mindre ører, større hoved og kraftigere lemmer end museunger.





(Se skitse på næste side)

MOSEGRIS ("VANDROTTE")

Kropslængde ca. 12 – 20 cm, halelængde ca. 8 – 12 cm. Vægt: 100 – 275 g. Mosegrisen med tilnavnet "Vandrotte" er ikke en rotte, men en studsmus tæt beslægtet med den noget mindre markmus. Kendes fra den brune rotte ved de korte ben, små øjne og små ører, der næsten er skjult i pelsen. Er et skadedyr i skovbruget, hvor den begnaver bark og rødder. Laver muldskud og kan være til stor gene i haver, hvor den spiser rodfrugter og blomsterløg.





FORSKEL PÅ MUS OG ROTTER

KEND FORSKEL PÅ MUS OG ROTTER VED DISSE KENDETEGN:

Mus

- Lang tynd hale med små hår
- Lange ører
- Lys farvet mave

Rotter

- Smalle ører
- Tyk hale uden hår
- Store poter

SKOVMUS



HUSMUS



HALSNBÅNDSMUS



MARKMUS



BRUN ROTTE



VANDROTTE



EKSEMPLER PÅ EKSKREMENTER


PATTEDYR




HUSMUS



BRUN ROTTE



STØRRELSESFORSKEL



FODSPOR



HUSMUS

BRUN ROTTE

