



Fjernelse af blærekateter (KAD)

Formål

At kateteret fjernes så smertefrit som muligt og uden at lædere urinrøret.

Krav til personalet

Varetages af sygeplejersker og assistenter.

Principper

Der benyttes rene principper, med håndhygiejne både før og efter proceduren. Der benyttes rene medicinske engangshandsker.

Fremgangsmåde

- Borgeren lejres liggende gerne med let bøjede ben
- Kateterposen tømmes
- Der lægges absorberende underlag under så man sikrer, at urin ikke løber ud på borgeren eller i sengen
- Ballonen tømmes med sprøjte



Herefter sættes den tomme sprøjte uden stemplet i igen



Dette for at sikre, at alt vandet kan komme ud af ballonen og at eventuelle ujævnheder der kan være på ballonen, og som kan ridse urinrøret, kan glattes ud (se næste billede).



Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Udarbejdet af
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Sachmann
Godkendt af
Marianne Hansen
Version 1.1

Fjernelse af blærekateter (KAD)

Gældende fra sep 2016
Rev. senest sep 2019



Herefter tages kateteret forsigtigt ud. Ved mænd udrettes den penoscrotale vinkel inden man trækker kateteret ud.

Hvis der ikke umiddelbart herefter anlægges et nyt kateter, gives borgeren en lille ble, da der kan komme ufrivillig vandladning herefter.

Observationer

- Borgeren opfordres til at drikke ca. 2 glas væske i timen, til der har været en normal "stor" spontan vandladning.
- Borgeren informeres om svie ved vandladning, hyppige vandladninger og eventuel inkontinens de første par dage efter seponering af kateter
- Borgeren informeres om infektionstegn

Hvis borgeren efterfølgende ikke kan tømme sin blære ordentligt, har toppet abdomen, klager over smerter svarende til blæren eller har vandladningstrang, kan akutsygeplejersken tilkaldes mhp at blærescane. Hvis der er mere end 400ml residualurin i blæren, skal borgeren engangskateriseres (egen læge eller vagtlæge informeres).

Litteraturhenvisning

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer, Forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrainage og inkontinenshjælpemidler, CEI udgave 1.1, 2015

<http://www.ssi.dk/~media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Urinvejsinfektion.ashx>

Sygehus Lillebælt, Urologisk afdeling, Blærekateter – seponering og observation, 09.10.2014

<http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/Files/dokument249657.htm>